

PROTOKOŁY ŁĄCZONE



PROTOKOŁY ŁĄCZONE

KLASYCZNY

- Pierwszy zabieg - Meso Xanthin F199® lub Meso Wharton P199® .
- Drugi zabieg w ciągu 7 dni - MesoSculpt C71® i/lub MesoEye C71® (można podać oba preparaty podczas jednego zabiegu).
- Później zabiegi należy wykonywać naprzemiennie co 7 dni.

ALTERNATYWNE

Iniekcja preparatów MesoSculpt C71® i Meso-Xanthin F199®/Meso Wharton P199® podczas jednego zabiegu:

- Etap 1: MesoSculpt C71® należy podać w podskórną tkankę tłuszczową środkowej i/lub dolnej części twarzy na głębokość 6-8 mm, w zależności od stopnia uwidocznienia podskórnej tkanki tłuszczowej.
- Etap 2: Iniekcja preparatu MesoXanthin F199® lub Meso Wharton P199® na głębokość 2-4 mm.

Stosowanie MesoEye C71® i MesoXanthin F199®/Meso Wharton P199®:

- nie zaleca się łączenia MesoEye C71® i MesoXanthin F199®/Meso Wharton P199® w tę samą okolicę podczas jednego zabiegu ze względu na ryzyko wystąpienia znacznych i utrzymujących się obrzęków pod oczami.
- Wymagany odstęp między iniekcją MesoEye C71® i Meso Xanthin F199®/Meso Wharton P199® w tę samą okolicę wynosi minimum 7 dni.

ŁĄCZONY MESO-WHARTON P199® i MESO-XANTHIN F199®

WIEK	SERIA	ODSTĘPY
Poniżej 50 r.ż.	Podstawowa	Etap 1: 4 zabiegi Meso-Xanthin F199® co 7-14 dni Etap 2: 4-6 zabiegów Meso Wharton P199® co 7-14 dni
	Podtrzymująca	1 zabieg Meso-Xanthin F199® i 1 zabieg Meso-Wharton P199® co 10-14 dni, raz na 8 tygodni
	Powtórzenie serii podstawowej	po 12 miesiącach
Powyżej 50 r.ż.	Podstawowa	Etap 1: 4 zabiegi Meso-Xanthin F199® co 7-14 dni Etap 2: 6-8 zabiegów Meso Wharton P199® co 7-14 dni
	Podtrzymująca	1 zabieg Meso-Xanthin F199® i 1 zabieg Meso Wharton 199® co 10-14 dni, raz na 6-8 tygodni
	Powtórzenie serii podstawowej	po 12 miesiącach

INTERAKCJE Z INNYMI ZABIEGAMI

1. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A

Zaleca się iniekcje preparatów Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® na 14 lub więcej dni przed iniekcją toksyny botulinowej typu A lub 14 lub więcej dni po iniekcji toksyny botulinowej.

2. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i PEELINGI CHEMICZNE

- zalecany jest schemat tydzień-po-tygodniu w przypadku połączenia z powierzchniowym peelingiem: iniekcja Meso-Xanthin F199® / Meso-Wharton P199® raz w tygodniu, po 7 dniach peeling, i tak dalej.
- połączenie ze średniogłębokim peelingiem: należy wykonać 2 tygodnie przed lub 2 tygodnie po serii podstawowej Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199®
- połączenie z głębokim peelingiem: należy wykonać 1-1,5 miesiąca przed lub 14 dni po podstawowej serii Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199®.

3. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i USIECIOWANY KWAS HIALURONOWY

- wskazana iniekcja Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® na 14 dni przed wypełnianiem usieciowanym kwasem hialuronowym
- preparaty Meso-Xanthin F199® i Meso Wharton P199® można stosować po 14 dniach od zabiegów z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego z pominięciem miejsca ich wprowadzenia.

4. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i OSOCZE BOGATOPLYTKOWE

- najbardziej optymalny schemat działania to seria zabiegów z osoczem bogatopłytkowym 14 dni po podstawowej serii Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199®.

5. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i NICI LIFTINGUJĄCE

- zaleca się wykonanie podstawowej serii Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® na 3-4 tygodnie przed zabiegiem wprowadzenia nici liftingujących
- nici na bazie polidioksanonu: zabieg Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® można wykonać 1-1,5 miesiąca później.
- nici na bazie prolikaprolaktonu: zabieg Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® można wykonać 1,5-2 miesiące później.

6. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i OPERACJE (LIFTING SMAS, PLASTYKA POWIEK, PLATYZMOPLASTYKA)

- zaleca się wykonanie podstawowej serii Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® na 2-3 tygodnie przed operacją plastyczną.
- można wykonać zabieg Meso Xanthin F199® / Meso Wharton P199® 3-4 dni po operacji z dodatkowymi wkłuciami w okolice szwu.
- seria podstawowa Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® - 1-1,5 miesiąca po operacji.

7. MESO-XANTHIN F199® / MESO WHARTON P199® i URZĄDZENIA

- ukończenie serii podstawowej Meso-Xanthin F199® / Meso Wharton P199® na 14 dni przed zabiegami inwazyjnymi.
- laserowa korekcja blizn zanikowych: ciągłość skóry naruszona poniżej 50% - iniekcja Meso-Xanthin F199® / Meso-Wharton P199® po 14 dniach od zabiegu; ciągłość skóry naruszona poniżej 75% - iniekcja Meso-Xanthin F199® / Meso-Wharton P199® po 21 dniach od zabiegu.

8. MESOEYE C71® i INNE PREPARATY DO INIEKCJI

- Nie wolno łączyć preparatu MesoEye C71® z innymi preparatami do iniekcji podczas jednego zabiegu w tej samej okolicy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Iniekcje preparatami Meso Wharton P199®, Meso-Xanthin F199®, MesoSculpt C71® i MesoEye C71® mogą spowodować zmianę koloru skóry, krótkotrwały rumień, obrzęk, łagodny świąd lub umiarkowaną bolesność i tkliwość w miejscu zabiegu utrzymujące się 1-3 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- jedna ampułkostrzykawka jest przeznaczona do użytku dla jednej osoby podczas jednego zabiegu
- po zabiegu należy wyrzucić strzykawkę, igłę i pozostały materiał
- nie narażać miejsc iniekcji na intensywne ogrzewanie (na słońcu, solarium, w saunie) lub silne ochłodzenie krótko przed zabiegiem

ZALECENIA PO ZABIEGU

- Nie stosować kosmetyków do makijażu przez 24 godziny po zabiegu.
- Podczas trwania serii zabiegów nie należy korzystać z łaźni parowych, saun i solarium.
- Nie narażać miejsca iniekcji na wychłodzenie (mróz, wiatr).
- Aktywne ćwiczenia fizyczne nie są zalecane przez 48 godzin po zabiegu.

STERYLIZACJA

Zawartość ampułkostrzykawkę jest sterylizowana metodą filtracji membranowej.

PRZECHOWYWANIE

- przechowywać z dala od światła słonecznego w temperaturze od 2 do 25°C
- nie zamrażać
- nie używać po upływie terminu ważności
- unikać uderzeń i innych uszkodzeń fizycznych

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI NA TERENIE POLSKI

ODA MEDICAL SP. Z O.O.
ul. Toruńska 18C/C
80-747 Gdańsk

+48 795 641 875

+48 606 979 670

